

29-1-2021

Meest gestelde vragen m.b.t. COVID 19 vaccin.

In aanvulling op de algemene informatie over de COVID 19 vaccinatie op de website van het RIVM ([Klik hier voor meer informatie](#)). Hieronder bespreken wij een aantal veelgestelde vragen over COVID-19 vaccinatie voor mensen met een reumatische ziekte, danwel bij het gebruik van afweer onderdrukkende medicijnen. Onderstaande antwoorden zijn gebaseerd op de kennis die we op dit moment hierover hebben en zijn afgestemd met de adviezen van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie.

Let op: ook na vaccinatie blijven de adviezen m.b.t. *social distancing*, hygiëne en testen bij klachten onverminderd van kracht.

Vraag: Moet ik me laten vaccineren?

Antwoord: Ja, u kunt veilig gevaccineerd worden. Het blijft ook na vaccinatie belangrijk om de standaard preventieve maatregelen te blijven volgen om infectie te voorkomen, zoals afstand houden, handen wassen, et cetera.

Vraag: Moet ik het normale vaccinatie schema aanhouden (zoals voorgeschreven door de fabrikant en overheid) of is 1 enkele vaccinatie prik voldoende?

Antwoord: Het is belangrijk niet af te wijken van de voorschriften en het normale vaccinatie schema aan te houden. Reden hiervoor is dat na 1 dosis mogelijk nog onvoldoende bescherming aanwezig is bij patiënten met afweer onderdrukkende medicatie.

Vraag: Is het veilig voor mij om een vaccinatie te krijgen wanneer ik reuma heb?

Antwoord: Ja, het is veilig om een vaccinatie te krijgen indien u een reumatische ziekte heeft.

Vraag: Moet ik met spoed een vaccinatie krijgen?

Antwoord: De overheid bepaalt de volgorde wie er als eerst gevaccineerd gaat worden, voor meer informatie: [Klik hier](#)

Vraag: Mag ik een verklaring/briefje waarin staat dat ik als eerste de vaccinatie mag krijgen?

Antwoord: Nee, de overheid bepaalt de volgorde van vaccinatie. [Klik hier](#) voor meer informatie.

Vraag: Is het ene vaccin beter dan het andere voor mij?

Antwoord: Het is te vroeg om hier iets over te zeggen. Op dit moment is vaccinatie met elk vaccin beter dan geen vaccinatie en er wordt dan ook geadviseerd niet te wachten met vaccinatie. De vaccins die momenteel goedgekeurd zijn, worden veilig geacht bij patiënten met reumatische ziekten en bij het gebruik van afweer onderdrukkende medicatie.

Vraag: Ik heb COVID-19 gehad en ben hersteld. Moet ik gevaccineerd worden?

Antwoord: Ja. Vaccinatie na het doormaken van COVID-19 wordt veilig geacht en biedt mogelijk extra bescherming en wordt daarom wel geadviseerd.

Vraag: Heeft het vaccin interactie met mijn medicatie?

Antwoord: Nee, COVID 19 vaccinatie geeft geen interactie met reuma medicatie voor zo ver we nu weten. [Klik hier](#) voor meer informatie. U bent na vaccinatie altijd beter beschermd dan zonder vaccinatie.

Vraag: Ik gebruik reuma remmende medicatie in tablet vorm, mag ik dan gevaccineerd worden?

Antwoord: Ja, dat mag.

Vraag: Ik gebruik immuunsuppressieve medicatie waaronder prednison mag ik dan gevaccineerd worden?

Antwoord: Ja, dat mag.

Vraag: Ik gebruik een subcutane biological, mag ik dan gevaccineerd worden?

Antwoord: Ja, dat mag.

Vraag: Ik krijg voor mijn reuma een infuus, mag ik gevaccineerd worden?

Antwoord: Ja, dat mag.

Vraag: Moet ik stoppen met mijn medicatie als ik gevaccineerd wil worden?

Antwoord: Nee, de kans op een opvlaming van uw reumatische ziekte is dan aanwezig en het is niet nodig om te stoppen met uw reuma medicatie voorafgaand aan de vaccinatie

Vraag: Hoe zit het met bijwerkingen?

Antwoord: Tot dusver zijn de vaccins die getest zijn veilig, en zijn er vergelijkbare milde bijwerkingen als met het influenza (griep) vaccin. De meest voorkomende bijwerkingen zijn: roodheid, pijn en zwelling op de prikplek. Dat is vergelijkbaar met veel andere vaccinaties, zoals de grieprik. Spier- en gewrichtspijn kunnen ook voorkomen, net als vermoeidheid, hoofdpijn, rillingen en verhoging. Deze bijwerkingen zijn mild en verdwijnen na een paar dagen.

Vanwege de (zeer kleine) kans op een allergische reactie op vaccinatie, wordt iedereen die gevaccineerd wordt na de vaccinatie 15 minuten geobserveerd door medewerkers op de priklocatie.

Vraag: Wat moet ik doen in het geval van een opvlaming van mijn ziekte?

Antwoord: Neem contact op met uw behandelend reumatoloog om dit te bespreken.

Vraag: Wat moet ik doen als ik ernstige bijwerkingen heb na vaccinatie?

Antwoord: De kans hierop is zeer klein. Neem in dat geval contact op met degene die u gevaccineerd heeft.

Vraag: Zorgt het vaccin voor een activatie van mijn ziekte?

Antwoord: Dit is onwaarschijnlijk, maar we hebben hier nog niet genoeg ervaring mee.

Vraag: Hoe zit het met lange termijn effecten?

Antwoord: Tot dusver zijn de vaccins die getest zijn veilig.

Vraag: Ik ben zwanger. Mag ik mij laten vaccineren?

Antwoord: Het advies is om u tijdens de zwangerschap wel te laten vaccineren, omdat het risico op een ernstige COVID-infectie bij reumatische ziekte en zwangerschap zwaarder weegt dan het eventuele risico op bijwerkingen van de vaccinatie. De inschatting is dat het niet aannemelijk is dat vaccinatie tijdens de zwangerschap schadelijk is voor de moeder en het ongeboren kind.

Vraag: Ik geef borstvoeding. Mag ik mij laten vaccineren?

Antwoord: Ja, tijdens het geven van borstvoeding mag u gevaccineerd worden.

Vraag: Ik heb zwangerschapswens maar ik ben nog niet zwanger. Mag ik gevaccineerd worden?

Antwoord: Ja, als u op het moment van vaccinatie nog niet zwanger bent, dan mag u zich laten vaccineren.